

duraultra®

Augentropfen

Zusammensetzung

- 10 ml duraultra® Augentropfen enthalten:
Actinoquinol-Natriumsalz 50 mg, Naphazolinnitrat 0,75 mg, Retinopalmitat (Vitamin A) 5.000 I.E.
- Andere Bestandteile:
Borsäure 116 mg, Natriumtetraborat 12 mg, Phenylmercuriacetat 0,2 mg, Natriumchlorid, Poly(1-vinyl-2-pyrrolidon), hydriertes Rizinusöl, Salzsäure, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke.

Eigenschaften

duraultra® ist eine Kombination eines Chinolinderivates (0,5%iges Natriumsalz der 8-Äthoxychinolin-5-Sulfosäure) mit Naphazolinum nitricum in isotonischer Lösung, die durch ihre Absorptionsbreite des UV-Lichtes in manchen Fällen Schutzgläser ersetzen kann.

Anwendungsgebiete

duraultra® wird angewandt:

- bei Blendungsstörungen prophylaktisch und therapeutisch, die sowohl durch Sonneneinwirkung (Ski, Wasser, Gebirge, Sport), als auch durch Lichtquellen (Röhrenbeleuchtung, Schweißen, Quarzlampen) ausgelöst werden;
- ferner bei abakteriellen Konjunktividen wie Jucken, Brennen, Fremdkörpergefühl, Tränen und Lichtscheu, Fernsehbeschwerden (Flimmern, Kopfschmerzen);
- bei Reizempfindungen, die durch das Tragen von Kontaktlinsen ausgelöst werden;
- bei Blendungsempfindlichkeit bei nächtlichen Autofahrten.

Gegenanzeigen

Engwinkelglaukom, Rhinitis sicca.

Besondere Hinweise für Kontaktlinsenträger:

duraultra® sollte während der Tragezeit von Kontaktlinsen nicht oder nur im zeitlichen Abstand (ca. 1/2 Stunde) angewendet werden.

Nebenwirkungen

Bei häufigem und länger dauerndem Gebrauch kann es in seltenen Fällen zu einer reaktiven Hyperämie und brennenden Schmerzen kommen. In diesen Fällen ist duraultra® abzusetzen.

Dosierung

Wenn vom Arzt nicht anders verordnet:

therapeutisch:

2mal innerhalb von 15 Minuten 1–2 Tropfen in den Bindehautsack einträufeln, dann je nach Schwere des Falles alle 1–3 Stunden wiederholen;

prophylaktisch:

vor Belichtung 2mal innerhalb von 15 Minuten 1–2 Tropfen in die Augen träufeln, dann alle 3 Stunden wiederholen.

Hinweise

Nach Anbruch nur 6 Wochen verwendbar. Nicht über 25 °C lagern.

Verfalldatum: Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Arzneimittel sorgfältig und für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information: November 2001

duraultra® Augentropfen sind als Arzneimittel rechtmäßig im Verkehr. Wie für alle Arzneimittel im Nachzulassungsverfahren müssen auch für duraultra® Augentropfen die Belege nach EG-Standards überprüft werden. Aufgrund der großen Anzahl solcher Arzneimittel konnten bisher nicht alle Nachzulassungsverfahren abgeschlossen werden. Darüber soll der folgende gesetzlich vorgeschriebene Hinweis informieren: Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.



OmniVision GmbH, Lindberghstrasse 7, D-82178 Puchheim
www.omnivision-pharma.com

Darreichungsform und Packungsgrößen:

duraultra®: 10 ml Augentropfen (N1)